

## Nr. 17 - RELENZA Rotadisks Plv. zur Inhalation (Zanamivir) TAMIFLU 12 mg/ml Plv. bzw. 75 mg Hartkaps. (Oseltamivir)

### Regelkonforme Anwendung – Dokumentation:

- Ausschließlich für hoch fiebernde Patienten binnen 48 Stunden nach Auftreten der klinischen Symptome.
- Bei Vorliegen einer Grippewelle in Österreich bzw. für bestimmte Bundesländer, welche durch das Virologische Institut der Medizinischen Universität Wien diagnostiziert und verlautbart worden ist - dies gilt auch für die H1N1-Grippe. Die diesbezügliche Information über Beginn und Ende der Grippewelle erfolgt über den Hauptverband.

### Nicht regelkonform – keine Dokumentation möglich:

- Verordnung von mehr als einer Packung.
- Außerhalb einer durch das Virologische Institut diagnostizierten und verlautbarten sowie von den gesetzlichen Krankenversicherungsträgern kommunizierten Grippewelle.
- Fehlen von influenzatypischen Symptomen (plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Gliederschmerzen,...).
- Therapiebeginn später als 48 Stunden nach Auftreten der klinischen Symptome.
- Prophylaxe (zB bei Grippeerkrankungen in der Umgebung).

Eine Kostenübernahme außerhalb der bestimmten Verwendung kann sich nur auf medizinisch begründete Einzelfälle beschränken. Um dem chef- und kontrollärztlichen Dienst die Entscheidung über eine eventuelle Kostenübernahme im Einzelfall zu ermöglichen, kennzeichnen Sie bitte das Bewilligungsansuchen eindeutig (zB **nicht regelkonform**, weil der Regelbestandteil .... nicht zutrifft) und führen Sie eine entsprechende medizinische Einzelfallbegründung an (außer bei jenen Krankenversicherungsträgern, die eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, wie zB die Oö. Gebietskrankenkasse).