

Nr. 1 - PLAVIX 75 mg Tbl. (Clopidogrel)

Regelkonforme Anwendung:

- Therapieversagen unter ASS: Dieses ist durch ein nachgewiesenes atherosklerotisches Ereignis im Sinne eines *Herzinfarktes*, eines *ischämischen Insultes/TIA* oder der Progredienz einer *PAVK unter laufender ASS-Therapie* definiert.
- Kombinationstherapie mit ASS bei folgenden Indikationen:
Für 3 bis 6 Monate: *Akutes Koronarsyndrom ohne Risikofaktoren*
Für 9 bis 12 Monate: Im Anschluss an eine *PTCA* mit oder ohne Stent; *akutes Koronarsyndrom bei Hochrisikopatienten* (= Rezidivereignisse und/oder nachgewiesene Atherosklerose in mehreren Gefäßbereichen).

Nicht regelkonforme Anwendung:

- Dauerkombinationstherapie von Plavix mit ASS über Jahre.
- Salicylatallergie: Diese ist selten und stellt kein Therapieversagen im Sinne des Regeltextes des EKO dar (Allergienachweis ist dem Bewilligungsansuchen beizulegen).
- Dokumentation bei gastrointestinaler Unverträglichkeit, Z. n. GI-Blutung: Der Wirkstoff Clopidogrel ist bei abgeheiltem Ulcus der Kombination von Salicylsäure mit einem PPI unterlegen (N Engl J Med 2005 Jan 20; 352 (3): 287-9).
- Diagnosen, welche nicht vom Regeltext des EKO erfasst sind, zB Carotisstenose, Nierenarterienstenose, Vorhofflimmern, Z. n. PTA.

Trifft die EKO-Regel nicht im vollen Umfang zu, dann ist **jedenfalls ein Bewilligungsansuchen erforderlich** (außer bei jenen Krankenversicherungsträgern, die eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, wie z. B. die Oö. Gebietskrankenkasse). Um dem chef- und kontrollärztlichen Dienst die Entscheidung über eine eventuelle Kostenübernahme im Einzelfall zu ermöglichen, kennzeichnen Sie bitte das vorzulegende Rezept eindeutig (z. B. "**nicht regelkonform**") und führen Sie eine entsprechende medizinische Begründung an.